

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS



La exposición al látex de caucho natural puede dar lugar a un gran abanico de manifestaciones clínicas, en distintos órganos y sistemas, muchas de las cuales pueden confundirse con cuadros o reacciones adversas de otros orígenes.

A continuación, se las presentamos.

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS



PIEL Y MUCOSAS:

- RUBOR
- PILOERECCIÓN
- PRURITO PALMOPLANTAR
- ERITEMA
- URTICARIA
- ANGIOEDEMA
- CIANOSIS
- HORMIGUEO
- AMPOLLAS

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS



SIST. RESPIRATORIO:

- CONGESTIÓN
- ESTORNUDOS
- RINOCONJUNTIVITIS/RINORREA
- PRURITO NARIZ/GARGANTA/OÍDOS
- RONQUERA/DISFONÍA
- EDEMA DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES (LENGUA, ÚVULA, PALADAR BLANDO, LARINGE, FARINGE, GLOTIS)
- TOS
- DISNEA
- TAQUIPNEA
- SIBILANCIAS/BRONCOESPASMO/ASMA
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR
- OPRESIÓN TORÁCICA
- APNEA
- ASFIXIA
- PARO

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS



SIST. GASTROINTESTINAL Y SIST. UROGENITAL:

- PRURITO/EDEMA (LABIOS, LENGUA, PALADAR, GARGANTA)
- SABOR METÁLICO
- DISFAGIA
- NÁUSEAS/VÓMITOS
- CÓLICO ABDOMINAL
- DIARREA
- INCONTINENCIA
- OLIGURIA/ANURIA
- ESPASMO URETRAL
- CÓLICO UTERINO/LUMBALGIA
- ARDOR/PRURITO/EDEMA (GLANDE, PENE, VULVA, VAGINA, RECTO, ANO)

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS



SIST. NERVIOSO Y SIST. CARDIOVASCULAR:

- CEFALEA PULSÁTIL
- MAREO
- CONFUSIÓN
- SUEÑO
- SENSACIÓN DE MUERTE INMINENTE
- CONVULSIONES
- PÉRDIDA DE CONCIENCIA
- TAQUICARDIA
- BRADICARDIA (RELATIVA O ABSOLUTA)
- HIPOTENSIÓN BRUSCA Y SEVERA
- DOLOR TORÁCICO
- SÍNDROME CORONARIO AGUDO (KOUNIS)
- SÍNCOPE
- ARRITMIAS
- COLAPSO CARDIOVASCULAR
- PARO

ALERGIA AL LÁTEX

LAS REACCIONES



No todas las reacciones son iguales.



Distintas personas pueden tener distintos síntomas en distintos órganos o sistemas.

Es más, una misma persona puede tener un conjunto de síntomas distintos en diferentes episodios, aun frente a un mismo gatillo.

ALERGIA AL LÁTEX

LAS REACCIONES



EL **LÁTEX** EN SÍ ES UN MATERIAL INOCUO, PERO LA **EXPOSICIÓN PRECOZ Y/O REITERADA A SUS PROTEÍNAS** PUEDE DAR LUGAR A REACCIONES INMUNOLÓGICAS, MUY VARIABLES E IMPREDECIBLES, DEPENDIENDO DE LA VÍA DE EXPOSICIÓN, EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, EL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN PREVIA Y LA SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL.

ALERGIA AL LÁTEX

LAS REACCIONES



LAS REACCIONES PUEDEN MANIFESTARSE DE MANERA **LOCAL O SISTÉMICA**, CON SÍNTOMAS **LEVES, MODERADOS O MUY GRAVES** QUE APARECEN CON MAYOR FRECUENCIA EN UN LAPSO COMPRENDIDO ENTRE POCOS SEGUNDOS Y ALGUNOS MINUTOS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN.

ALERGIA AL LÁTEX

LAS REACCIONES



LOS SÍNTOMAS LEVES PUEDEN PROGRESAR RÁPIDAMENTE HACIA LA **ANAFILAXIA** (UN CUADRO SEVERO QUE INVOLUCRA A 2 O MÁS ÓRGANOS O SISTEMAS SIMULTÁNEAMENTE, QUE **DEBE TRATARSE EN FORMA PRECOZ CON ADRENALINA**).

LA ANAFILAXIA ES UNA **EMERGENCIA MÉDICA**, Y LA DEMORA EN SU TRATAMIENTO PUEDE CONDUCIR AL SHOCK ANAFILÁCTICO, CON SERIO COMPROMISO PARA LA VIDA.

ALERGIA AL LÁTEX

LAS REACCIONES



EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO EN LA SENSIBILIZACIÓN O LA INDUCCIÓN DE REACCIÓN ALÉRGICA, ES LA **EXPOSICIÓN A MATERIALES DE LÁTEX** DE CAUCHO NATURAL POR VÍA CUTÁNEA, MUCOSA, SEROSA, INHALATORIA, DIGESTIVA Y/O SANGUÍNEA.

ALERGIA AL LÁTEX

LAS REACCIONES



CUANDO EL SISTEMA INMUNE SE SENSIBILIZA, YA NO EXISTE UN NIVEL DE EXPOSICIÓN AL LÁTEX SEGURO.

LO QUE HAYA PROVOCADO UNA REACCIÓN LOCAL Y/O LEVE EN EL PASADO, PUEDE CONDUCIR A UNA REACCIÓN SISTÉMICA Y/O SEVERA EN EL FUTURO.

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS

CONSIDERACIONES PERIOPERATORIAS



ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE TANTO DENTRO DE QUIRÓFANO COMO EN EL PERIOPERATORIO AUMENTA EL RIESGO DE UNA REACCIÓN ANAFILÁCTICA GRAVE POR LÁTEX:

- por la cantidad de artículos de látex natural usados en el ámbito quirúrgico,
- por las partículas respirables que liberan al aire ambiente esos artículos,
- porque la exposición al látex puede ocurrir por todas las vías posibles y
- porque los síntomas pueden pasar desapercibidos y/o reconocerse tarde.

VEAMOS QUÉ SUCEDE EN LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y SISTEMAS:

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS

CONSIDERACIONES PERIOPERATORIAS



PIEL Y MUCOSAS:

Los síntomas pueden ser difíciles de apreciar porque el paciente suele estar cubierto por los campos y, en algunas prácticas, por la ausencia de luz.

SISTEMA RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR:

Incremento de la presión inspiratoria, aumento del end-tidal de CO₂. Los pacientes que están tomando beta-bloqueantes, están en riesgo de desarrollar cuadros más graves caracterizados por bradicardia paradójica, hipotensión profunda y broncoespasmo grave. Estos agentes pueden impedir la efectividad del tratamiento con epinefrina.

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS

CONSIDERACIONES PERIOPERATORIAS



SISTEMA GASTROINTESTINAL:

Pueden haber ausencia de síntomas o estos ser difíciles de apreciar bajo anestesia general, pero pueden manifestarse en pacientes bajo anestesia regional, sedación o en el área de reanimación.

SISTEMA NERVIOSO:

Síntomas valorables únicamente en pacientes sin anestesia general ni sedación.

LA ALERGIA AL LÁTEX ES LA SEGUNDA CAUSA DE ANAFILAXIA EN QUIRÓFANO DURANTE LA ANESTESIA, EN ADULTOS, Y LA PRIMERA CAUSA EN NIÑOS.

ALERGIA AL LÁTEX

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Y COMO SI TODO ESTO FUERA POCO



RECORDEMOS QUE HASTA UN **20%** DE LAS PERSONAS QUE EXPERIMENTAN UNA REACCIÓN ANAFILÁCTICA, PUEDEN SUFRIR **ANAFILAXIA BIFÁSICA O ANAFILAXIA RETARDADA:**

- una reaparición de los síntomas sin re-exposición al LÁTEX (o al alérgeno desencadenante) tras la aparente resolución del cuadro, generalmente grave y resistente al tratamiento.
- el intervalo asintomático entre ambos episodios, oscila entre 1 a 72 horas, por lo que la duración óptima de la observación del paciente después de la reacción inicial debería ser de 48 a 72 horas.

@saludsinlatex

¿TODAVÍA TE QUEDAN DUDAS DE QUE NOS URGE SUBSTITUIR EL LÁTEX POR MATERIALES INOCUOS LIBRES DE LÁTEX?

LÁTEX NATURAL:

SE TOCA, SE INHALA, SE TRAGA, SE ABSORBE,
SE INOCULA, SE TRANSFIERE, CONTAMINA,
SENSIBILIZA, ENFERMA, TE AÍSLA, TE MATA.



¡LA PUCHA
QUE VALE
LA PENA
ERRADICARLO
DE NUESTRAS
VIDAS!

@saludsinlatex

Para más información, visitá:
www.saludsinlatex.com.ar